



Impfaufklärung mit Astra Zeneca

- Geimpft wird der Impfstoff von Astra Zeneca gegen die Corona-Infektion (=“Vaxzevria“)
 - Keine Impfung bei Temperatur $>38,5^{\circ}\text{C}$ oder Schwangerschaft
 - Keine Nachimpfung bei anaphylaktischer Reaktion auf 1. Impfung
 - die Impfung erfolgt in den Deltamuskel im Oberarm
 - nach der Impfung bitte 2-5 Minuten auf die Impfstelle drücken, wenn „Blutverdünner“ eingenommen werden
 - häufigste Nebenwirkungen der Impfung: (eher zu beobachten nach der 1. Impfung und bei Jüngeren) lokal Schmerzen, Schwellung, Bluterguss sowie am Folgetag Kopf-/Gliederschmerzen, Übelkeit, selten Schüttelfrost oder Fieber
 - bitte nach der Impfung noch 15 Minuten warten (**30 Minuten** bei Patienten mit „Blutverdünnern“ oder relevanter allergischer Reaktion im Vorfeld)
 - nach der Impfung bitte 2 Tage keine stärkere körperliche Belastung
 - bei Temperaturerhöhung oder Schmerzen: Eigenmedikation mit Paracetamol oder eventuell vorhandenem Schmerzmittel möglich (nicht prophylaktisch einnehmen), bei hohem Fieber, schlechtem Allgemeinzustand etc. bitte an den Hausarzt wenden oder wenn Symptome länger als 3 Tage anhalten
 - die 2. Impfung sollte nach 12 Wochen erfolgen, Termin bitte direkt vereinbaren!
 - Nach der 1. Impfung besteht wahrscheinlich nach 3 Wochen ein Teilschutz gegen schwere Corona-Infektionen, 15 Tage nach der 2. Impfung ist mit einem weiter gesteigerten Schutz zu rechnen
 - Trotz der Impfung bitte unveränderte Fortführung der Hygienemaßnahmen, da noch nicht sicher ist, ob Geimpfte nicht doch das Virus weitergeben können
-
- Ich habe keine weiteren Fragen und möchte ohne weiteres Gespräch direkt geimpft werden.
 - Ich habe noch Gesprächsbedarf.

Lebach, _____
(Datum)

(Unterschrift)